



DISERBO POMODORO DA INDUSTRIA

(*) Numero massimo di trattamenti con sostanze Candidate Alla Sostituzione (CAS): 4

Queste sostanze sono evidenziate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive CAS, vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con **2 sostanze** attive **candidate** alla sostituzione vale per **2 interventi**)

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre trapianto (Pre semina)	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (1) Acido Pelargonico Napropamide Bnefluralin	(1) <u>Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.</u> Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.
	Graminacee annuali estive e dicotiledoni	Aclonifen (*) (2) Pendimetalin (*) S-Metolaclor (2) Flufenacet (*) (3) Metribuzin (*)	(2) Impiegabile al massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata. (3) Al massimo 1 volta ogni 3 anni e solo in pre-trapianto
	Dicotiledoni	Pyraflufen-etile (4)	(4) Impiegabile una sola volta o in pre-trapianto o in post-trapianto
Pre emergenza (*)	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Aclonifen* (2)	(2) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e patata



DISERBO POMODORO DA INDUSTRIA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Post trapianto: si consigliano interventi localizzati	Graminacee e dicotiledoni	Rimsulfuron Acido pelargonico (5)	(5) Diserbo dell'interfila, assicurarsi che il prodotto non colpisca la coltur
	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Propaquizafop Clethodim	
	Dicotiledoni	Metribuzin (*) Pyraflufen-etile (6)	(6) Impiegabile una sola volta o in pre-trapianto o in post-trapianto

(*) Il diserbo di pre emergenza deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.